

Najczęstsze przyczyny krwawień z dróg rodnych u kobiet

Ciąża i stany towarzyszące ciąży	plamienie/krwawienie implantacyjne w prawidłowej ciąży, poronienie, puste jajo płodowe, ciąża obumarła, ciążowa choroba trofoblastyczna, ciąża pozamaciczna, niewydolność cieśniowo-szyjkowa, łożysko przodu, przedwczesne oddzielenie się prawidłowo usadowionego łożyska, krwawienia z naczyń zatoki brzeżnej łożyska, krwawienie z rozwierania szyjki macicy w okresie okołoporodowym
Przyczyny organiczne związane z narządem płciowym	Erytroplakia/ectoprion/nadżerka szyjki macicy; stany zapalne szyjki macicy, błony śluzowej macicy, jajowodów, zmiany nowotworowe łagodne (mięśniaki, polipy), adenomioza, endometrioza, gruźlica narządu rodowego, zmiany zanikowe pochwy na tle hypoestrogenizmu, rozrosty błony śluzowej macicy, nowotworzenie śródnabłonkowe CIN I-CIN III, zmiany nowotworowe złośliwe (rak szyjki macicy, gruczolakorak błony śluzowej macicy, mięsak, rak jajowodu, rak jajnika), hormonalnie czynne guzy jajników
Przyczyny organiczne pozagenitalne	żylaki odbytu, rak odbytnicy, zapalenia dolnego odcinka dróg moczowych, kamica nerkowa, mięsko ujścia cewki moczowej, polipy pęcherza moczowego, rak pęcherza moczowego, endometrioza pęcherza moczowego lub jelita grubego

<p>Schorzenia układowe</p>	<p>choroby nadnerczy (przerost nadnerczy, choroba Cushinga), zespoły androgenizacyjne, choroby wątroby, gruczolaki przysadki mózgowej/hiperprolaktynemia utajona lub czynnościowa, choroby nerek, koagulopatie/choroba von Willebranda, choroby krwi (białaczki, trombocytopenia), niedoczynność/nadczynność tarczycy, niewydolność podwzgórza (emocjonalna, stresogenna, wyniszczenie, otyłość, anorexia nervosa, itp.), zespół policystycznych jajników, choroby autoimmunologiczne np. lupus erythematosus, choroby spichrzeniowe np. choroba Gauchera</p>
<p>Przyczyny jatrogenne</p>	<p>leki: antykoagulanty (heparyna), niesterydowe leki p/zapalne, leki psychotropowe, preparaty naparstnicy, spironolakton, chemioterapia w schorzeniach onkologicznych, rezerpina, sulpiryd, , złożona antykoncepcja hormonalna, antykoncepcja gestagenowa, HTZ, niezrównoważona gestagenami ETZ u kobiet z zachowaną macicą, SERM (tamoksifen), wkładka wewnątrzmaciczna w tym system długotrwale uwalniający gestagen, radioterapia</p>
<p>Urazowe</p>	<p>urazy mechaniczne związane z wprowadzaniem/obecnością ciała obcego, obrażenia związane z aktywnością lub</p>

	przemocą seksualną, związane z badaniem ginekologicznym lub zabiegami w obrębie narządu płciowego
Inne	nadużywanie alkoholu, tytoniu czy stosowanie środków odurzających, wyczynowe uprawianie sportu, praca w wysokich temperaturach, zmianowa lub w środowisku metali ciężkich